

# קורס אופטימיזציה



הוכח כי  $a^k - b^k$  מוחלק ב- $(a - b)$  בחוכחה מתחששים בתחלולה

$$a^{k+1} - b^{k+1} = a \cdot a^k - ab^k + ab^k$$

כלומר, מחסירים ומוסיפים את האיבר  $ab^k$  מהין הרעיון איך ידע תלמיד בתרגילים אחר איך איבר להחסיר ולהסביר? על חסרונו זה, ניתן להתגבר בשיטה הבאה

חוותח:

$$(1) \text{ עבור } 1 = a$$

$$a = a^1 - b^1$$

וזה אכן מוחלק ב- $(a - b)$  כנדרש

2) נניח שהטענה נכונה בשכיל  $k$  ונוכיח את נכונותה בשכיל  $k + 1$

נניח כי בשכיל  $k$  טבוי  $a^k - b^k$  מוחלק ב- $(a - b)$   
צריך להוכיח כי  $a^{k+1} - b^{k+1}$  מוחלק ב- $(a - b)$

לב השיטה

נכיה טענה זו בשיטה הדומה לפתרון 2 מושוואות ב-2 געלמים, על ידי השוואת מקודמים

נושום  
I  $a^k - b^k$   
II  $a^{k+1} - b^{k+1}$

נכפיל את I בגורם כלשהו כך שההחחנה מ-III תבטל איבר אחד  
נכפיל את I, ב- $b^k$ , כדי לבטל את האיבר הראשון.

$$I \quad a^k \cdot a - ab^k / \quad \cdot a$$

$$II \quad a^k \cdot a - b^{k+1}$$

נתבען ב-III - I

$$a^k \cdot (a - b) = (a - b) \cdot b^k$$

ובבורו, כי הפרש זה מוחלק ב- $(a - b)$

מכיוון ש-III - I מוחלק ב- $(a - b)$  (a) ולי הנטה האינדוקציה I מוחלק ב- $(a - b)$  הרי מזה טובע שגם II מוחלק ב- $(a - b)$  כנורשי ה庫רא ישים לב שرك I הוכפל בעוד II נשאר ללא כל שינוי – כי II הוא שצורך להוכיחו ולכן לא יכול לגעת בו בעוד שבטי I, על פי הנטה האינדוקציה מוחלק ב- $(a - b)$  ולכן אפשר להכפילו בכל גורם שהוא

## מבט על הוראת המתמטיקה

החותם יסוד

1) המתמטיקה היא יצירה המשתנה בהומדיה

2) הטקסטים המתמטיים הטוביים נכתבים כשהותוא ידועה

מראש או לפחות משוערת

3) רוב האנשים אינם מוכשרים למתמטיקה ואין אוחבים אותה

מהנהחות אלו עלות המשקנות הבאות:

בנ' תחילה ללימוד המתמטיקה צריך להתבסס על ייצירתיות

בב' רצוי שהתלמיד ידע מראש או ישר את התוצאה שהו אמור להגעה אליה

בג' צריך לאפשר קיומם של פערים גדולים מאוד בין התלמידים  
השוניים מבלי למסכל אותם

כדי לממש משקנות אלו אפשר לדאוג שיתקיים התנאים האלה,  
למשל:

גנ' רוב התרגילים בספר הלימוד יוגשו עם פתרונים המלא  
אחרי שהתלמיד יקרא תרגילים פטורים רבים והוא יחבר לו  
תרגילים נוספים ויפתור אותם

גנ' לתרגילים הלא פטורים ישקבל התלמיד תוצרף בדרכ' כל  
התוצאה הסופית (גם במבחןים)

סוג נספ' של תרגילים כולל תוכאה סופית שתהייה נכונה  
או שגויה והתלמיד יצטרך להכريع ולנקח

גנ' יכולה של התלמיד לחابر שאלות ולהתמודד איתן יהיה  
משקל עיקרי בהערכתנו

עמוס גואטה

בי"ס פתוח "אבלטום"

ובי"ס אינשטיין, בן-שםן

## הוכחת התחלקות באמצעות אינדוקציה

הרשימה הקצרה שלහן, מתארת שיטה פשוטה להוכחת  
התחלקות על ידי אינדוקציה  
בספר אלגברה, 4, 5 ייחידות לימוד, כרך שני, עמ' 142, מודגמת  
ההוכחה לבעה

## טעויות כתיב

שمحתי קיבל את גליון עלייה האחרון יש בו חומר מעניין  
והערכה מושכת  
הערה שולית מקריאה חתופה שמתי לב לכמה טויות כתיב,  
בעיקר בהקשר של שמות לעוזים כך  
עמ' 30 Basil ולא Blaise Pascal (וכן באסיל בכותרת)  
Mersenne Pierre  
עמ' 31 Mersennne

**פרופ' אברהט מלקטן**  
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב  
אוניברסיטת ניוגורן, באיר שבע

## ?כות וראשונים

זה עתה עברתי על עלייה 8 וקרויתי את החערות של המערכת  
למאמר של עלי עותמאן (עמ' 57-57).  
בעמ' 57, במה שמצוג כ'היסטוריה היסטוריה', מופיעות השורות  
חבות "רך באמצעות המאה ה-19 פיתחה וכי אין תבנית  
כללית לפתרון"

מספר הערות  
1 Galois נתרג ב-1832 בגיל 20 (לא באמצעות המאה ה-19)  
2 הראשון שהוכיח את המשפט על אי קיום של פתרון של  
משוואתמעלה 5 (בעזרת התוצאות שורשיות) היה אבל (Abel),  
בשנת 1824 את הטפור המדויק אפשר למצאו בספרו של  
בויאר (Boyer) שאותם מפינים אליו בעמ' 556-555.  
3 גם מר עותמאן וגם העורכים מדברים בצורה כללית על  
"תבניות" או "נוסחאות כלליות" מבלי לפרט כוונתנו לנוסחה  
אשר בניה בעזרת פעולות חיבור, חיסור, כפל וחולוק והוצאת  
שורש (כלומר פתרון של המשוואה  $a = x^k$ ) למשל אם  
מקדמי הפולינום הם  $e, d, c, b, a$  אז דוגמא לתבניות כללית  
תניה

$$\frac{a}{c} + b - \frac{d}{c/d} + e + \frac{b}{e} - c$$

בכבוד רב,

**פרופ' בניימין וייט**  
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב  
האוניברסיטה העברית בירושלים

השיטה טובה לכל תרגילי החתולקות המוכרים ואני דורשת  
שם תחבורה נוספת

נתבונן בדוגמה המופיעה בספר וקטורים בנישוח גאומטריה  
כוחה כי  $5 + 9 = 3$  מחלק ב-8

**הוכחה:**  
עבור  $1 = \chi$  זה מיידי  
נניח כי חטענה נכונה בסביל  $k$  וכן כוחה עבור  $I + k$  כלומר, צריך  
להוכיח ש  $5 + 9^{k+1} = 3$  מחלק ב-8

**הוכחה:**  
נושות  
 $I = 3 \cdot 9^k + 5$   
 $II = 3 \cdot 9^{k+1} + 5$

כדי להוכיח את המקדם של  $9$  בשתי המשוואות יש לכפול את  
 $I$  ב-9  
מקבלים

$$I^* = 27 \cdot 9^k + 45$$

$$II = 27 \cdot 9^{k+1} + 5$$

$$I - II = 40$$

40 מחלק ב-8.

לעתם זאת, נתבונן בהסבר המופיע בספר.  
"כדי שוכן לנצל את אקסיומות האימדוקציה, נחפש באגד ימין  
את  $9 \cdot L(1 + 8)$ "

כאן עומד התלמיד חתום ונום זה שאינו יודע לשאול, ומקשה  
מוחע החלטו להוכיח את  $9 \cdot L(1 + 8)$  מה נעשה בתרגילים  
אחרים:  
או לדוגמה, במקרה של  $\#$  -  $\#$ , מוצע החלטו לחצסיר ולהוציא  
אייבר מסוים איך ידוע מה לח痴יני'

לעתם זאת, בשיטות השוואת מקדים, תמיד יודעים מה לעשות,  
ואף פעם לא מנהשים!

אוריה רוקח,  
קדומים